

Kategori	Parameter	Volym	Tid	Referens Värde	
Hormoner	T4	75µL	15 min	Hund 15~60nmol/L(1.2~4.7µg/dL) Katt 15~50nmol/L(1.2~3.9µg/dL)	
	TSH	75µL	15 min	Hund 0~37mIU/L(0~0.68ng/mL) Katt 0~21mIU/L(0~0.32ng/mL)	
	Cortisol	75µL	15 min	16.6~166nmol/L(0.6~6.01µg/dL))	
	cProg	75µL	15 min	10~20ng /mL(31.8~63.6nmol/L)	
Diabetes	HbA1c	Helblod 10 µL	5 min	3%~4.5%	
FDPS	D-Dimer	Helblod 15 µL / Citratplasma 10 µL	5 min	0~250ng/mL	
Pankreatit	cPL	10µL	10 min	<200µg/L	
	fPL	75µL	15 min	<3.5µg/L	
Njurmarkör	cCys-C	10 µL	10 min	<1.2mg/L	
	fCys-C	10 µL	15 min	<7mg/dL	
	SDMA	10 µL	5 min	Hund 0~14µg/dL(0~16µg/dL på valpar) Katt 0~14µg/dL	
Hjärta	cNT-proBNP	75 µL	10 min	<800pmol/L	
	fNT-proBNP	75 µL	10 min	<150pmol/L	
	c-cTnl	75 µL	15 min	<0.3 ng/mL	
	f-cTnl	75 µL	15 min	<0.3 ng/mL	
Inflammation	Hund-CRP (cCRP)	10 µL	3 min	0~10mg/L	
	Felin SAA (fSAA)	10 µL	3 min	0~8mg/L(µg/L)	
	Equine SAA (eSAA)	10 µL	10 min	<50mg/L	
Immunologi Felin trippel antikroppstest	FCV Ab	10 µL	10 min	<0.5U level 0; 20.1~30.0U level 4 0.5~4.0U level 1; 30.1~60.0U level 5; 4.1~9.0U level 2 >60.0U level 6 9.1~20.0U level 3;	
	FPLV Ab	10 µL	10 min	<0.5U level 0; 10.1~20.0U level 4 0.5~2.5U level 1; 20.1~40.0U level 5; 2.6~5.0U level 2 >40.0U level 6 5.1~10.0U level 3;	
	FHV Ab	10 µL	10 min	<0.5U level 0; 30.1~40.0U level 4 0.5~10.0U level 1; 40.1~100.0U level 5 10.1~20.0U level 2 >100.0U level 6 20.1~30.0U level 3;	
Immunologi Canine trippel antikroppstest	ICH Ab	10 µL	10 min	<0.5U level 0; 100.1~400.0U level 4 0.5~2.0U level 1; 400.1~600.0U level 5; 2.1~60.0U level 2 >600.0U level 6 60.1~100.0U level 3;	
	CPV Ab	10 µL	10 min	<0.5U level 0; 5.1~10.0U level 4 0.5~1.0U level 1; 10.1~20.0U level 5; 1.1~2.5U level 2 >20.0U level 6 2.6~5.0U level 3;	
	CDV Ab	10 µL	10 min	<1.0U level 0; 10.1~20.0U level 4 1.0~2.0U level 1; 20.1~50.0U level 5 ; 2.1~5.0U level 2 >50.0U level 6 5.1~10.0U level 3;	
	* RV Ab	10 µL	10 min	0~0.5IU/mL low level	
Infektionssjukdomar	CCV Ag	Fekalt prov 75 µL	10 min	Positivt: Infekterad med viruset. Svagt positivt: Låg virusmängd; det misstänks vara i ett tidigt skede av infektion eller under avgiftningsfasen. Vänligen gör en samlad bedömning baserat på kliniska symtom. Negativt: Ingen infektion.	
	CDV Ag	Konjunktivalsekretprov, 75 µL	10 min		
	CPV Ag	Fekalt prov 75 µL	10 min		
	FCoV Ag	Fekalt prov 75 µL	10 min		
	FPV Ag	Fekalt prov 75 µL	10 min		
	FHV Ag	Konjunktivalsekretprov, 75 µL	10 min		
	FCV Ag	Konjunktivalsekretprov, 75 µL	10 min		

Provtyp: Helblod/serum/plasma. Det rekommenderas att använda serum eller plasma, förutom för HbA1c, D-Dimer (helblod).

Nivå 0: Vaccination rekommenderas;
Nivå 1 och 2: Låg titer av antikroppar i kroppen;
Nivå 3 och 4: Medellåg titer av antikroppar i kroppen;
Nivå 5 och 6: Hög titer av antikroppar i kroppen;
* Pågående: RV Ab, FeLV Ag, FIV Ab



egnordlab.com
EG NordLab AB Sjöängsvägen
3C, 192 72, Sollentuna
+46 70 321 46 62